Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des **études ont permis de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des **études ont permis de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre***, le **manteau*** et le **noyau***. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale*: elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.

Un modèle de la structure interne de la Terre est progressivement mis en place pendant la première moitié du XXème siècle. En effet, des études ont permis **de délimiter des discontinuités majeures** permettant de distinguer des **enveloppes internes** concentriques d'épaisseurs inégales : la **croûte terrestre**, le **manteau** et le **noyau**. On distingue deux types de croûtes :

- la croûte continentale : elle occupe les 30 premiers kilomètres de la Terre sous les continents et peut atteindre une profondeur de 70 km sous les chaînes de montagnes.

- **la croûte océanique** : son épaisseur est en moyenne de 7 km sous les océans.